

Échelle de Braden : Pour anticiper le risque d'escarre

Date : _____

Risque sévère: Score total ≤ 9







Risque élevé: Score total 10 – 12

Nom du patient: _____

Risque modéré: Score total 13 – 14

Score Moyen: Score total 15 – 18

Pour un usage professionnel: _____

Facteur de risques	Description				Score
Perception sensorielle Capacité à réagir de manière significative à l'inconfort lié à la pression 	1. Limitation complète Ne répond pas (ne gémit pas, ne sursaute pas ou ne halète pas) aux stimuli douloureux en raison d'un niveau de conscience diminué ou d'une sédation. Ou capacité limitée à ressentir la douleur sur la majeure partie de la surface du corps.	2. Très limité Répond seulement aux stimuli douloureux. Ne peut communiquer son inconfort que par des gémissements ou de l'agitation. Ou a une limite sensorielle diminuant la capacité de ressentir de la douleur ou de l'inconfort sur la moitié du corps.	3. Diminution légère Réponses aux commandes verbales mais ne peut pas toujours communiquer son inconfort ou le besoin d'être tourné. Ou a une limite sensorielle diminuant la capacité de ressentir de la douleur ou de l'inconfort sur la moitié du corps.	4. Aucune déficience Répond aux commandes verbales. N'a pas de déficit sensoriel limitant la capacité de ressentir ou d'exprimer la douleur ou un inconfort.	<div>1 – 4</div>
Degré d'humidité exposant la peau à l'humidité 	1. Constamment humide La peau est maintenue humide presque constamment par la transpiration, l'urine, etc. L'humidité est détectée chaque fois que le patient est déplacé ou tourné.	2. Souvent humide La peau est souvent, mais pas toujours, humide. Le linge doit être changé au moins « une fois par 8h »	3. Occasionnellement La peau est parfois humide, nécessitant un changement de linge supplémentaire environ une fois par jour.	4. Rarement humide La peau est généralement sèche; le linge n'a besoin d'être changé qu'à intervalles réguliers	<div>1 – 4</div>
Activité Degré d'activité physique: 	1. Déjeuner Confiné au lit.	2. Capacité à être au fauteuil La capacité à la marche sévèrement limitée ou inexistante. Ne peut pas porter son propre poids et/ou doit être assisté dans une chaise ou un fauteuil roulant.	3. Marche occasionnelle Marche occasionnelle durant la journée, avec un périmètre limité, avec ou sans assistance. Passe la majorité du temps alité ou au fauteuil.	4. Marche fréquemment. Marche à l'extérieur de la chambre au moins deux fois par jour et à l'intérieur de la chambre au moins une fois toutes les 2 heures pendant les heures diurnes	<div>1 – 4</div>
Mobilité Capacité à changer et à contrôler sa position corporelle 	1. Immobilité complète Incapacité à réaliser des changements de postures mêmes infimes du corps ou des extrémités sans aide.	2. Très limité Fait de légers changements occasionnels dans la position du corps ou des extrémités; incapacité à réaliser des changements fréquents ou significatifs de façon autonome.	3. Légèrement limité Effectue des changements fréquents, bien que légers, de manière autonome, de la position du corps ou des extrémités.	4. Pas de limite Effectue des changements de position importants et fréquents de manière autonome	<div>1 – 4</div>
Nutrition ¹ Schéma d'apport alimentaire normal : Rien par voie orale ² Intraveineux ³ TPN: Nutrition parentérale 	1. Très pauvre Ne mange pas un repas complet. Mange rarement plus d'1/3 de son repas. Mange 2 portions ou moins de protéines (viande ou produits laitiers) par jour. Prend peu de liquide. Ne prend pas de complément alimentaire liquide, Et/ou maintenu sous liquides clairs ou IV 2 pendant plus de 5 jours.	2. Probablement insuffisant Mange rarement un repas complet et ne mange généralement qu'environ la moitié des aliments proposés. L'apport en protéines comprend seulement 3 portions de viande ou de produits laitiers par jour. Prend occasionnellement un complément alimentaire OU reçoit moins qu'une quantité optimale d'un régime liquide ou d'une alimentation entérale	3. Adéquat Mange plus de la moitié de la plupart des repas. Mange un total de 4 portions de protéines (viande, produits laitiers) chaque jour. Refuse occasionnellement une portion de viande, mais accepte un complément alimentaire. Ou suivant un régime d'alimentation entérale ou TPN 3, qui répond probablement à la plupart des besoins nutritionnels.	4. Excellent Mange quotidiennement de la viande. Ne refuse jamais une portion de viande. Mange habituellement un total de 4 portions ou plus de viande et de produits laitiers. Mange occasionnellement entre les repas. Ne nécessite pas de supplémentation.	<div>1 – 4</div>
Frottement et cisaillement 	1. Problème Nécessite une aide modérée à maximale pour se mouvoir. Un levé complet sans glissement est impossible. Glisse fréquemment dans le lit ou la chaise, nécessitant un repositionnement fréquent avec une assistance maximale. La spasticité, les contractures ou l'agitation entraînent des frottements presque constants.	2. Problème potentiel Se déplace difficilement ou nécessite une assistance minimale. Lors d'une mobilisation, la peau glisse probablement, dans une certaine mesure, contre le linge de lit, la chaise, les dispositifs de contention ou d'autres dispositifs. Maintient une position relativement correcte dans le fauteuil ou le lit, la plupart du temps, mais glisse occasionnellement vers le bas.	3. Pas de problème apparent Mobilité autonome dans le lit et la chaise; a une force musculaire suffisante pour se soulever complètement pendant le déplacement. Maintient une position adéquate dans le lit ou sur la chaise en toutes circonstances.	-	<div>1 – 4</div>
Score total 15 – 18	Un score total de 12 ou moins représente un risque élevé				<div>1 – 23</div>





> **Score inférieur ou égal à 9 sur l'échelle de Braden Risque sévère**



Skin Health

Produit recommandé dans la gestion de l'humidité

Ultrasorbs[®] Advanced⁺

- Haute à très haute absorption
- Respirante
- **Capacité de levage 150 Kg**
- Protection pour table de salle d'opération
- Polytrauma/neurologie
- ECMO

Référence	Capacité d'absorption
USAPE6191ES	1,900 ml
USAP4090ES	5000 ml
EXTRASRBE150	5300 ml



**Score total ≤ 10
Risque élevé:**

**Score total ≤ 13
Risque modéré**

Produit recommandé dans la gestion de l'humidité

Ultrasorbs[®] Advanced

- Faible à très haute absorption
- Respirante
- Version stériles disponible en 3 tailles
- Contrôle des MASD pour les situations légères à complexes
- Protocole standard MASD avec ULTRASRBE6191
- Couverture complète du lit avec MSCE4090PUPS/B

Référence	Capacité d'absorption
ULTRASRBE2540	300 ml
ULTRASRBE4561	900 ml
ULTRASRBE6191	1,900 ml
MSCE4090PUPS	900 ml
MSCE4090PUPSB	900 ml



**Score total ≤ 15
Score Moyen:**

Produit recommandé dans la gestion de l'humidité

Ultrasorbs[®]

- Absorption moyenne
- Respirante
- Patient standard de réanimation/ soins intensifs
- Patient incontinent
- Maternité
- Patient alité/en fauteuil roulant

Référence	Capacité d'absorption
EXTRASRBE6090	500 ml
EXTRASRBE7590	1,900 ml

Les alèses et les protections sèches sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur l'étiquetage correspondant.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1350_FR 03/2023