



# Oltre l'80%

di tutte le perforazioni nei guanti chirurgici non vengono rilevate.<sup>1</sup>

Più a lungo vengono utilizzati i guanti, più alto diventa il rischio di perforazione.<sup>2</sup>

La perforazione dei guanti può portare alla trasmissione di agenti patogeni infettivi.

## TECNICA DEL DOPPIO GUANTO



1. Indossa un sottoguanto di colore scuro.



2. Metteteci sopra un guanto esterno di colore chiaro per creare contrasto netto.



3. Individua facilmente se si verificano perforazioni nel tuo guanto.

### SensiCare PI Green MSG92xx

- Realizzato in poliisoprene Isolex, privo di lattice al 100%
- Superficie pensata per adattarsi al guanto esterno
- Rivestimento interno in aloe vera
- 0,21 mm di spessore alla punta delle dita



### DermAssure™ Green MSG65xx

- Realizzato in neoprene, privo di lattice al 100%
- Superficie pensata per adattarsi al guanto esterno
- Senza acceleratori per ridurre il rischio di dermatite allergica da contatto
- 0,21 mm di spessore alla punta delle dita



### Signature Latex Green MSG55xx

- Realizzato in lattice
- Superficie pensata per adattarsi al guanto esterno
- Rivestimento interno in aloe vera
- 0,19 mm di spessore alla punta delle dita



Per ulteriori informazioni, contattate il vostro Medline vostro Rappresentante di zona o visitare il nostro sito web: [medline.eu/it](http://medline.eu/it)

1. Thomas, S., Agarwala, M., Mehtab, G. Intraoperative glove perforation—single versus double gloving in protection against skin contamination. Post Graduate Medical Journal. 2001; 77:458-460. Disponibile all'indirizzo: <http://pmj.bmj.com/content/77/909/458.full>. Accesso al 18 dicembre 2015. 2. Partecke, Lars Ivo, Anna-Maria Goerdt, Inga Langner, Bernd Jaeger, Ojan Assadian, Claus-Dieter Heidecke, Axel Kramer e Nils-Olaf Huebner. 'Incidence of Microperforation for Surgical Gloves Depends on Duration of Wear.' Infection Control and Hospital Epidemiology 30.5 (2009): 409-14.

Questi guanti sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati dagli operatori sanitari. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.



Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia

